

黄连阿胶汤治心肾不交诸证

心肾不交是指心肾之间水火阴阳的交济失调而言。若肾水不足，不能上济心火，心火必然失制而偏亢，心之阴阳失去平衡，心火亢盛，心神就会受到扰动，而不能入静，出现心烦不寐、心悸健忘、头晕耳鸣等症候；若心火偏亢，引动相火，耗伤肾阴，扰动精室又会出现腰膝酸软、多梦遗精，甚者滑精，舌红，脉细数。中医调治心肾不交诸症，宜滋肾养心、交通心肾。方用黄连阿胶汤。

处方：黄连6克，黄芩9克，白芍12克，阿胶12克（烊化），鸡子黄2枚。水煎服，每日1剂。

兼口干咽燥者，酌加生地、麦冬、五味子滋阴生津；心中烦热甚者，可酌加山栀子、竹叶、灯心草清心除烦；失眠严重、精神抑郁者，酌加远志、夜交藤益智

安神；梦遗明显者，加生龙骨、牡蛎。

原方也可酌加肉桂，入肾经，以引火归原，又防芩、连寒凉太过；与黄连相配名曰交泰丸，交通心肾。佐以滋阴药物对阴虚火旺、心肾不交之严重神经衰弱、不寐梦遗患者，诸药不效，用此确有良好效果。但用量宜小，一般黄连6克，肉桂3克即可。

病例：杨某，女性，30岁，高校教师。自述头晕心悸、心烦失眠、多梦已有2年，加重3个月。有时彻夜不寐，曾服天王补心丹、柏子养心丸、朱砂安神丸、刺五加片等药治疗数月无效，于2021年6月16日就诊。患者形体消瘦，面色潮红，五心烦热，口干咽燥，舌红少苔，脉象细数。诊断为不寐。证属阴虚火旺，虚


火扰心，心肾不交。治宜滋阴降火，交通心肾。方用黄连阿胶汤加味：黄连6克，黄芩9克，白芍12克，麦冬12克，五味子9克，阿胶12克（烊化），鸡子黄2枚（另冲），夜交藤30克，肉桂3克，茯苓9克，甘草6克。6剂，水煎服，每日1剂。

药后，失眠大有好转，但仍饥而不欲食，脘腹闷胀不适，上方减阿胶为9克，加陈皮9克，生山楂15克。续服6剂后，夜能安睡5~6小时，自觉精神良好，诸证减轻，舌质淡红，脉和缓。改用补心丹、六味地黄丸调理40天后告痊愈。

按：心肾不交在临床表现为头晕耳鸣、心悸多梦、口燥咽干、潮热盗汗、腰酸腿软、失眠等症状。在病理变化上主要是肾阴亏损，阳不潜藏，经脉失于濡养

温煦，导致心肝功能紊乱所致。肾为先天之本、元气之根、水火之宅，真阴真阳之所在。肾藏精，生髓，通脑，主生殖，主五液，肾虚则阴阳失调，必然影响心肝诸脏。肾属足少阴，心属手少阴，心肾关系密切，特别在肾阴虚的影响下，则髓海不足，元神之府失常，神明易失守，出现心肾不交之证。此证多见于脑力劳动者，患者往往诉述繁多，检查又无明显异常所见，且病程缠绵，顽固难愈。

本证之发病机理不外阴虚阳盛，或阴阳两虚，前者乃肝肾阴虚，肝阴虚肝阳偏亢，肾阴虚，肾水不能上承于心，心火独盛，后者则为肾脏之阴阳两虚，说明肝肾虚损实为本证的主要病机。朱丹溪创有“阴常不足，阳常有余”之说，都对其有所启发，故治



疗本证处方用药重视滋补，尤其是滋补肝肾。但临幊上又可见到心气虚，心阳不能下交于肾，或思虑过度，劳伤心脾，或水不涵木，肝阳上亢等均能导致本证；故治疗时，不外从调理心、肝、脾、肾四脏的机能方面着手，使肾阴充足，肾阳亦壮，阴阳调和，水火既济，方可取效。

(欧阳军)

人工流产术后出血治方

人工流产术后出血多因术中损伤冲任，致使胞宫收缩无力，残存胎膜和瘀血淤于胞中难以排出，恶血不祛新血难安所致。瘀血当清，新血亦当生。若专用清则新血亦伤，若专用生则旧血反滞。根据这一病特点，临床选用《傅青主女科》生化汤进行治疗颇合病机。笔者对人流术后出血临床选用生化汤加味进行治疗，可收事半功倍之效。服药最少者3剂，最多者6剂即可治愈。

处方：当归20克，川芎10克，炒桃仁12克，甘草6克，炮干姜5克，丹参20克，蒲公英30克，益母草20克，阿胶15克（烊化）。

水煎2次，合并药液，分早晚2次温服，每日1剂。

方解：方中重用当归补血活血，化瘀生新为君药；辅以川芎行气活血，当归、川芎、桃仁、丹参相伍善攻瘀血速生新血；阿胶补虚养血；蒲公英甘寒能清热解毒，益母草微寒行血祛瘀，二药相伍可有效预防继发感染；炮姜只用5克，不过借以行气之用，炮姜与诸活血祛瘀之药相伍以增强其祛瘀生新之功；甘草调和诸药。全方共奏调整冲任、缩宫活血、祛瘀生新、抗感染之效。

(姜明辉)

升降汤加减治疗时行感冒

笔者采用《伤寒温疫条辨》杨栗山之升降散加减改作汤剂，治疗时行感冒退热快、疗效高，一般服药3~4天即可治愈。

处方：僵蚕10克，蝉蜕10克，大黄6克（后入），姜黄10克，紫苏叶15克，板蓝根20克，贯仲10克。上药水煎2次，合并药液，分早晚2次温服，每日1剂。

随症加减：高热不退、烦渴引饮者，加生石膏30克，知母10克，芦根20克；身有低热、肢节酸痛者，加青蒿15克，羌活10克；咽喉肿痛明显者，加射干15克，山豆根10克；咳吐白黏痰者，加半夏10克，前胡10克；咳吐黄黏痰者，加桑白皮15克，全瓜蒌20克；头痛明显者，加菊花15克，白芷15克。

按：《伤寒准绳·伤寒类伤寒辨》载：“霜降以后当寒而不寒，乃更温暖，因而衣被单薄以致感寒而病者，冬温也。”“冬时应寒而反大温，此非其时而有其气。”“温而上受，首先犯肺。”邪热

内郁，肺气不得清肃，气机升降失常。“热者清之”“火郁发之”，治疗应升清降浊宣郁散火。选用升降汤宣畅卫、气、营、血，调理三焦，升清降浊，腑气得通，邪热得祛。

方中僵蚕味辛气薄，得天地清化之气，轻浮而升阳中之阳，能祛风除湿，清热解郁，化痰散结。杨氏称：“能辟一切怫郁之气。”蝉蜕甘咸而凉，其气清肃，能散风热，开肺窍，通散郁热之邪。姜黄苦辛温，行气散郁，活血通络，宣通气血。大黄苦寒，宣通气滞，泻火解毒，活血化瘀。板蓝根性苦寒，能清热解毒，凉血利咽。贯仲性苦微寒，清热解毒。紫苏叶辛温归肺脾，具有发汗散寒、止咳止喘之功。诸药配合，苦寒并用，升、降、散诸法同施，升清降浊，宣郁散火，调节人体气机升降出入。本方突出宣畅气机，重在清透郁热、凉血解毒，治疗时行感冒退热快，方小力宏，无任何副作用。

(梁兆松)

笔者自拟疏肝化瘀汤治疗经前发热36例，全部治愈。其中32例随月经来潮体温降至正常，4例经潮继续服药而愈。服药最短者3天，最长者7天。

治疗观察的36例经前发热，发病原因，以经期及经前“生气”、抑郁等精神刺激最多，其次饮冷、涉水、冒寒亦为发热诱因。患者均伴食欲不振、头痛乏力、烦躁易怒、失眠多梦、胸闷太息，部分患者两胁、少腹或两乳胀痛。患者均经行不畅、量少、色暗、有血块。

处方：柴胡12克，酒白芍15克，枳壳12克，青皮12克，香附12克，炒桃仁10克，红花10克，归尾15克，川芎10克，五灵脂10克，生蒲黄10克，酒黄芩10克，青蒿15克，牛膝15克，甘草10克。水煎

2次，合并药液，分早晚2次温服，每日1剂。

随症加减：高热持续不退者，加钩藤20克（后下）；月经来潮后仍发热、经色暗、量少、有块者，继续用原方；经色鲜、量多、无块者，去桃仁、红花、蒲黄、牛膝，加茜草15克，白茅根30克；食欲不振、腹胀者，加山楂30克，麦芽30克；大便干者，加酒大黄10克；气滞重者，加木香10克，郁金15克；因寒者，加肉桂3克，干姜10克。

按：“女子以肝为先天”，以血为本，肝为将军之官，藏血之脏，体阴而用阳，性喜条达而恶抑郁。“女子善怀而多郁”，

利湿退热治小儿喉痹

小儿喉痹也叫小儿疱疹性咽峡炎，是由上呼吸道病毒感染引起。证见患儿发热，流涎，拒食，口干，尿赤，便干，精神食欲差，指纹紫，体温38.6°C，咽部充血，咽峡部、软腭、悬雍垂有多个大小不等的灰白色疱疹及溃疡，舌质红，苔黄腻。证属湿热喉痹。治宜清热解毒，利湿退热。

处方：茵陈、黄芩、连翘、浙贝母、板蓝根各5克，藿香、滑石（布包）、薄荷、射干、栀子各4克，大黄3克（后下），炙甘草2克。水煎，取药液，分少量多次服，每日1剂，连服3剂。一般服用1剂后，体温恢复正常，大便通畅。服3剂后流涎消失，能进食，疱疹消失。

按：方中滑石、茵陈、黄芩清热利湿；射干、浙贝母降气利咽喉；板蓝根、连翘清热解毒；薄荷芳香化浊，行气醒脾；黄芩清热燥湿；藿香芳香化湿。诸药合用，共奏清热解毒、利湿退热之功，故获痊愈。

(胡佑志)

处方：紫霄花10克，紫河车10克，丹参15克，蜈蚣2条，白芍10克，淫羊藿10克，露蜂房6克，巴戟天10克，枸杞子15克，香附12克，柴胡10克，葛根10克，九香虫6克，牛膝6克。水煎2次，合并药液，早晚饭后分服，每日1剂，30日为1个疗程。连服3个疗程，收效后以2倍量做蜜丸，丸重9克，每日3次，每服1丸，以巩固疗效。

功能益肾疏肝，活血通络，兴阳振痿。

按：方中淫羊藿、巴戟天、露蜂房益肾壮阳，以兴阳事。紫霄花性甘温，益阳涩精，是治阳痿的专用药。紫河车味甘咸性温，是血肉有情之品，补气养血益精。枸杞子滋补肝肾，以益阴助阳。蜈蚣走窜力最速，内而脏腑，外而经络，凡气血凝聚之处，皆能开之，故可通达瘀脉，善治阳痿。白芍养血活血，补肝柔肝，营养宗筋，既能养血益精，和调阴阳，又能兼治蜈蚣辛温走窜伤阴之弊。瘀血阻于经络，宗筋失养，难以充盈而致阳痿，瘀血又是肾虚肝郁的病理产物，故用丹参活血通经散瘀。肝经络阴器，宗筋乃肝所主，肝失疏泄，气血失调，经络运行障碍，宗筋难得其养，阳事不兴，故用香附、柴胡疏肝解郁通经。九香虫善入肝肾之位，功善理气化滞，温中助阳。古有“治痿独取阳明（《黄帝内经》语）”“阴中求阳（景岳语）”之论述，故佐以葛根鼓舞阳明津气，兼起阴气。牛膝益肾而引血下行阴部。诸药合用，共奏益肾疏肝、活血通络以兴阳事之功。

(王豪)



海南大风子

[别名]大风子、大枫子、麻风子、驱虫大风子。

[来源]为大风子科植物海南大风子 Hydnocarpus hainanensis (Merr.) Sleum 成熟种子。

[性味归经]辛，热，有毒。归肝、脾、肾经。

[功能主治]祛风燥湿，攻毒杀虫。用于麻风，杨梅疮，疥癣，痤疮。

[用法用量]外用适量，捣敷或煅存性研末调敷。内服宜慎，内服入丸、散，一次量0.3~1克。

疏肝化瘀汤治疗经前发热

2次，合并药液，分早晚2次温服，每日1剂。

随症加减：高热持续不退者，加钩藤20克（后下）；月经来潮后仍发热、经色暗、量少、有块者，继续用原方；经色鲜、量多、无块者，去桃仁、红花、蒲黄、牛膝，加茜草15克，白茅根30克；食欲不振、腹胀者，加山楂30克，麦芽30克；大便干者，加酒大黄10克；气滞重者，加木香10克，郁金15克；因寒者，加肉桂3克，干姜10克。

按：“女子以肝为先天”，以血为本，肝为将军之官，藏血之脏，体阴而用阳，性喜条达而恶抑郁。“女子善怀而多郁”，

郁则疏泄失常，气血不利。

经前发热的病因病机是经前或经期受到强烈的精神刺激，导致肝气郁结。“气有余便是火”。肝脏内寄相火，两阳相加，同气相求，引起发热。再者肝郁则气滞，气滞而血凝，造成瘀血性发热。治疗必须疏肝化瘀并重，不可偏废。“木郁达之”“血实者决之”。达郁取柴胡疏肝散之义，化瘀取桃红四物汤之用，疏肝化瘀汤即二方化裁而出。加葛根、钩藤以增清泄肝热之效，直达病所；芩芍酒制引药入血，无遏阻之弊。本组少数病例因寒而致，故加桂姜温通血脉之品。

(姜明辉)

二紫振痿汤治阳痿