

十一月适合种植哪些蔬菜?

11月份的节气有立冬和小雪。露地种植的喜温蔬菜已经结束... 1.做好露地喜温蔬菜如番茄、黄瓜、辣椒、茄子、土豆等的拉秧清园工作...

油菜苗期冬前管理三步骤

据国家气候中心预测,今年“双拉尼娜”事件发生阶段性极端降温的可能性较大。为此提出以“扩大油菜移栽面积,培育壮苗安全越冬”为主的油菜冬前管理技术,具体措施如下: 1.降低田间湿度...

国家粮食和物资储备局发出紧急通知

要求进一步做好秋粮收购为农服务工作

为进一步做好秋粮收购工作,切实保护好种粮农民利益,国家粮食和物资储备局发出通知要求各地进一步做好秋粮收购为农服务工作...

干燥、储存、加工、销售等工作,促进农民减损增收。针对今年部分地区已收获粮食水分偏高的现象,要科学合理利用烘干设施,协调有关部门做好粮食烘干所需电力等供应,保障烘干设施运行,避免出现霉粮坏粮...

做到粮食质量安全监测关口前移,切实把好收购粮食质量关。要继续扎实做好收购期间疫情防控,开展常态化消杀工作,改善收购场所环境卫生,做到疫情防控和粮食收购两不误...

十一月温室草莓管理五要点

温度管理。11月份温室已覆膜,温度管理视草莓苗大小而定,草莓苗偏小的管理温度要适当地高些,以促进其生长,大苗要降低管理温度,适当控制其生长的速度... 补充叶面肥料。在草莓开花初期加强叶面肥的补充...



11月2日,北京超市发连锁各直营店冬储菜上市。据了解,冬储菜采用产地直采的方式供应市场。在销售冬储菜期间,北京超市发连锁50家直营店每天将提供150余吨大白菜、30余吨大葱。

加强管理防治桃树烂根病

加强管理。桃树烂根病大多是生长期雨水过多,土壤中含水过量,排水不良,土壤板结,有机质少,土壤酸性和微酸性所引发的,栽植过深或培土过厚,耕作时损伤或蛴螬等地下害虫咬伤根系会加重病害程度...

小麦播种后什么时候打除草剂效果好?

随着农业机械化程度提高,麦田杂草种类增多,北方麦田主要以播娘蒿、麦家公、看麦娘、荠菜等阔叶杂草为主,近两年以节节麦、雀麦为主的禾本科杂草也出现,发生面积略有增加... 防治关键时期 根据麦田杂草发生规律,其防治时期有两个关键时期...

下甸至3月上旬,防治时期宜早不宜晚,太晚杂草防治困难,且小麦可能引起药害。 药剂选用 对以荠菜、播娘蒿、婆婆纳、猪殃殃等阔叶类杂草为主的麦田,可选用45.9%双氟·滴辛脂悬浮剂每亩30~35克或20%氯氟吡氧乙酸乳油50~60毫升...

二是施药要掌握好时间,天气温度太低不能施药,选择晴暖的天气既利于药效的发挥,也对小麦更安全,如冬前除草,若遇寒流不能施药。 三是使用除草剂要严格掌握安全用量,严格按照操作规程,不漏喷,更不能重喷,以免对作物造成药害...

创建安全发展示范城市 建设平安和谐美丽盐都

★ 安全生产 ★ 警钟长鸣 ★ 消除隐患